

BÍO

Delfan Plus IT

Biostimolante a base di aminoacidi liberi
con effetto “curactive” contro gli stress
abiotici.

Let's grow greener

 **Rovensa
Next**

Delfan plus IT

Biostimolante

Biostimolante a base di aminoacidi liberi con effetto “curactive” contro gli stress abiotici.

Descrizione

Sostanza bio-nutriente facilmente e rapidamente assimilabile, formulata con una concentrazione massima di L-alfa aminoacidi fisiologicamente attivi e funzionali. L'applicazione di Delfan Plus IT dopo uno stress abiotico consente un ottimale recupero vegeto produttivo (effetto curactive).

Principali benefici

- ▶ Immagazzinamento dell'azoto.
- ▶ Sintesi delle proteine.
- ▶ Sintesi del DNA.
- ▶ Sintesi della clorofilla.
- ▶ Precursori e regolazione degli ormoni.
- ▶ Fotosintesi.
- ▶ Fioritura e impollinazione.



Soluzione
anti-stress



Effetto
biostimolante



Risparmio
energetico



Effetto
complessante




Effetto
carrier



Migliore
qualità

Soluzione anti-stress



Lo stress fa perdere produttività agli agricoltori.
Combattere lo stress significa ottenere un'elevata redditività.

effetto
curactive



RECUPERARE VELOCEMENTE DOPO GLI STRESS ABIOTICI

La formulazione a base di aminoacidi liberi di Delfan Plus, assicura un rapido recupero durante o subito dopo il periodo di stress abiotico.

Recupero


Recupero efficiente e immediato dopo periodi critici, grazie al miglioramento della sintesi proteica.

Riduzione del periodo di latenza

Grazie all'alta fonte di energia le piante tornano ad essere produttive prima, riducendo il periodo di latenza dopo lo stress.

Precursore produzione ormoni

ad una alternativa fonte di energia



Stimolazione dopo l'applicazione degli agrofarmaci

Recupero più rapido ed efficiente dopo uno stress fitotecnico (prodotti fitosanitari).

↑ DNA ↑ Proteine

Aumenta la sintesi del DNA e delle proteine

↑ Produzione

↑ Prestazioni

Dosi e modalità di applicazione

Applicazione fogliare		
Mais e cereali minori	1,5-3 L/ha	Quando l'altezza delle piante è circa 60 centimetri
Ortaggi a foglia (lattuga, cicorie etc.)	1,5-2 L/ha	Quando le piantine sono alte 5 cm. Ripetere il trattamento ogni 2 settimane
Fragole	1-2 L/ha	Applicare dopo la formazione delle nuove radichete e ripetere il trattamento prima della fioritura. Ripetere i trattamenti in fase di accrescimento dei frutti.
Melone, cocomero	1-2 L/ha	Subito prima della fioritura. Se la coltura è sotto protezione plastica, effettuare la prima applicazione al momento in cui si toglie la plastica. Eseguire trattamenti supplementari con 1-2 L/ha durante l'inizio dello sviluppo dei frutti. Ripetere dopo 14 giorni
Pomodoro, peperone, melanzane	1-2 L/ha	Applicare durante l'inizio della crescita dei frutti, applicazioni supplementari ogni 2 settimane
Ornamentali	1-2 L/ha	Applicazione prima della fioritura. Ripetere il trattamento ad intervalli di 2 o 3 settimane
Frutticole (esclusi i susini)	1-2 L/ha	Effettuare il primo allo stadio di bottoni, poco prima della fioritura. Ripetere i trattamenti ogni 2-3 settimane. Non applicare in piena fioritura
Vite	1-1,5 L/ha	Effettuare il primo trattamento allo stadio grappoli ben visibili e ripetere i trattamenti ogni 2-3 settimane. In caso di miscela come coadiuvante nei trattamenti con fungicidi, non superare la dose di 100ml/hl, non miscelare con rameici
Colture estensive e industriali	1,5-2 L/ha	Applicare in abbinamento ai diserbi e quando la coltura abbia raggiunto i 10-15 cm di altezza
Fertirrigazione		
Piante ornamentali	4 L/ha	Ripetere il trattamento ogni 2-3 settimane